

# 使用说明书

## Instruction Manual



# GST Tag 免疫沉淀试剂盒

## GST Tag Immunoprecipitation Kit

### 产品描述

TargetMol 的 GST Tag 免疫沉淀磁珠可特异性地与带有 GST 标签的蛋白结合，可以用于蛋白质、蛋白质复合物、蛋白质核酸复合物和其他抗原的免疫沉淀 (IP)。免疫沉淀磁珠试剂盒配有经过优化的预制缓冲液，为免疫沉淀实验提供了最佳的反应条件，增强了实验的稳定性。本品适用于细胞裂解物、细胞分泌上清、血清、腹水等来源的抗原样品。

### 产品特点

- 非特异性吸附低
- 高效率、高产量、低消耗
- 操作灵活、简便
- 实验结果可靠、重复性高

### 产品组成

产品编号	产品名称	产品包装
C0121B	GST Tag Immunomagnetic Beads	1 mL
C0124	Immunomagnetic Beads Cell Lysis Buffer	20 mL
C0125	Immunomagnetic Beads Washing Buffer (10×)	20 mL
C0126	Immunomagnetic Beads Acidity Elution Buffer	4 mL
C0127	Immunomagnetic Beads Neutralization Buffer	1 mL

### 产品信息

GST Tag 免疫沉淀磁珠	
基质	硅基磁珠
粒径	200 nm
磁珠浓度	10 mg/mL
结合能力	≥ 0.6 mg GST 标签蛋白/mL 磁珠
配体	鼠源抗 GST 单克隆抗体
应用推荐	IP, Co-IP

## 操作说明

### 1. 细胞裂解液制备

使用 Cell Lysis Buffer 处理细胞样品，按照标准步骤制备细胞裂解液，置于冰上备用，或于 -20 °C 长期保存。

### 2. 磁珠预处理

1) 将免疫沉淀磁珠用漩涡振荡器振荡 1 min，使磁珠重新悬浮，取 25 μL 磁珠悬液放入 1.5 mL EP 管中。

2) 用蒸馏水将 Washing Buffer (10×) 稀释为 1×，使用 Washing Buffer (1×) 进行后续实验。向 EP 中加入 500 μL Washing Buffer 进行洗涤，温和翻转 EP 管数次，使磁珠重新悬浮。将 EP 管放入磁性分离器，静置 1 min，进行磁性分离，吸去上清液，取下 EP 管。重复上述洗涤步骤 2 次。

### 3. 免疫沉淀步骤

1) 向 EP 管中加入 500 μL 制备好的细胞裂解液，将 EP 管放在旋转混合仪上，在 37 °C 下旋转混合 30 min。如结合力较弱，可在室温下孵育 1 h，或在 4 °C 下孵育过夜。

2) 孵育结束后，进行磁性分离，弃去或保存上清以供后续分析。

3) 向 EP 管中加入 500 μL Washing Buffer 进行洗涤。进行磁性分离，吸去上清液，取下 EP 管，重复洗涤磁珠 3 次。

### 4. 抗原洗脱

提供以下几种抗原洗脱方案，用户可根据后续检测的需要选择不同的洗脱方法。

1) 变性洗脱法：此方法洗脱的样品适用于 SDS-PAGE 检测。向 EP 管中加入 100 μL SDS-PAGE Loading Buffer (自备)，混合均匀，95 °C 加热 5 min。然后进行磁性分离或者离心（室温，13000 g, 10 min），收集上清液，进行 SDS-PAGE 检测。

2) 酸性洗脱法：向 EP 管中加入 100 μL Acidity Elution Buffer，置于旋转混合仪上在 37 °C 孵育 5-10 min。然后进行磁性分离或者离心，收集上清液。如需中和酸性洗脱液，可向 100 μL 洗脱液中加入 50 μL Neutralization Buffer，调整 pH 至中性。

## 保存条件

C0124: -20 °C, 2 年。 其余试剂: 4 °C, 2 年。

## 注意事项

- 避免冷冻磁珠。磁珠应保存在储存溶液中，防止干燥。
- 为了减少磁珠的损失，每次磁性分离的时间不应少于 1 min。
- 在从磁珠保存管中取出磁珠之前，应充分震荡以确保均匀悬浮。操作过程中注意避免产生气泡。
- 建议使用质量较好的移液器吸头和反应管，以避免因磁珠和溶液附着而造成损失。
- 操作者可根据实际需求，利用抗体结合反应步骤和抗原结合反应步骤中收集的上清液，检测抗体、抗原与磁珠的结合情况。
- 在 IP 实验中，不同类型的抗体和抗原结合的亲和力会有所不同。如果使用本说明书提供的缓冲体系未能获得理想的实验结果，操作者可以自行筛选和配制缓冲液进行实验。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

